

予防接種で子どもを守ろう

2014-11-23 丹生郡医師会健康公開講座

赤ちゃんの予防接種

生後2か月	肺炎球菌	3回
	ヒブ	3回
	* 口タ	3回
	* B型肝炎	3回
生後3か月	4種混合	3回
(百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ)		
生後5か月	BCG(結核)	1回

1歳になってからの予防接種

MR(はしか・風疹)	1回
みずぼうそう	2回
* おたふくかぜ	2回
肺炎球菌・追加	1回
ヒブ・追加	1回
4種混合・追加	1回

3歳になってからの予防接種

日本脳炎	2回
	(翌年1回)

小学校入学前の予防接種

MR(はしか・風疹)	1回
------------	----

予防接種を受けないといけないの？

(例) **ポリオ**ってなあに？







日本には
ポリオ(小児麻痺)はない。

でもインドやアフリカでは、まだ発生している。

昭和35年ポリオ大流行

それまでは年間 1000人前後(！)
昭和35年には 6500人に！！





インフルエンザ・ワクチン

- 10月～12月に受ける
(遅くとも12月中旬までに)
- 効果は約半年
↓
毎年注射が必要(型も少し変わる)
- 生後6か月～13歳未満は2回



インフルエンザ・ワクチン

効果はいまひとつ


おとな	70%
小・中学生	50%
6歳以下	20～30%

しかし唯一の予防法

インフルエンザ 生ワクチン

低温馴化 25°C

弱毒化



インフルエンザ生ワクチン
鼻にシュッ(注射ではない)



ワクチン(予防接種)は
世界中の研究者が
長い年月をかけて作り上げた
人類への贈りもの



大切な赤ちゃんの命を守れるのは
あなたです

生後 2ヶ月から